

NOTICE

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Dénomination

DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale

Composition qualitative et quantitative

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium

quantité correspondant à chlore actif0,500 g pour 100 ml

Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

Forme pharmaceutique

Solution pour application locale : flacon en polyéthylène de 60 ml, 250 ml, 500 ml et 1 000 ml.

Classe pharmaco-thérapeutique

Antiseptique (D : Dermatologie)

Nom et adresse de l'exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

Place Lucien Auvert

77020 MELUN CEDEX

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie de la peau et des muqueuses,
- l'antisepsie des plaies.

3. ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament ?

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Précautions d'emploi

- Ne pas avaler
- Ne pas utiliser en même temps qu'un autre antiseptique
- Attention : risque de décoloration de certaines fibres textiles

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter sans un rinçage soigneux intermédiaire.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Les applications locales de DAKIN COOPER® STABILISE se font sans dilution, soit :

- en lavages (ex : lavage des plaies),
- en bains locaux (ex : bains de doigts, de pieds, de siège),
- en irrigations,
- en compresses imbibées ou en pansements humides.

Renouveler les applications selon les besoins.

Mode et voie d'administration

Usage externe.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas d'ingestion accidentelle, l'antidote est le bicarbonate de sodium.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Possibilité de sensations de brûlure ou d'irritation (en cas de plaies importantes ou en chirurgie gynécologique) ; ceci est habituellement sans conséquence et ne doit en général pas faire modifier le traitement.
- Risque d'effet irritatif sous occlusion prolongée.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 30°C.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Avril 2002