

COQUELUSEDAL NOURRISSONS suppositoire

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

COMPOSITION

Extrait hydroalcoolique mou de grindélia 10 mg

Extrait hydroalcoolique mou de gelsémium 5 mg

Excipients : propylèneglycol, glycérides hémissynthétiques solides.

Boîte de 10 ou 12 suppositoires.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE

Laboratoires ELERTE

181-183, rue André Karman - 93300 AUBERVILLIERS - France

tél : 01-48-34-75-03

1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Médicament de phytothérapie.

Ce médicament est traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes.

Attention : si les troubles persistent, consulter votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire ?

Contre-indications : n'utilisez jamais COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire en cas de lésions récentes de l'anus ou du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration)

Précaution d'emploi : en cas d'apparition de fièvre, d'une expectoration grasse ou purulente, ou en cas de maladie chronique des bronches et des poumons, demander l'avis de votre médecin.

Liste des excipients à effet notoire : propylèneglycol.



Interaction avec d'autres médicaments : veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire ?

Posologie

1 à 2 suppositoires par jour.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale.

Mode d'administration

Voie rectale. Réservé au nourrisson jusqu'à 30 mois.

Si vous avez utilisé plus de COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire que vous n'auriez dû :

La forme suppositoire rend cette éventualité improbable.

Si vous oubliez d'utiliser COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Des effets locaux (irritation de l'anus ou du rectum), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée, le rythme d'administration et la posologie élevés.

En raison de la présence de propylèneglycol, risque d'irritation cutanée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER COQUELUSEDAL NOURRISSONS, suppositoire ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 14 Aout 2006.