

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?
 3. COMMENT PRENDRE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
- 1. QU'EST-CE QUE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique

ANTIHISTAMINIQUE H₂

(A : appareil digestif et métabolisme)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans) dans :

- les brûlures d'estomac (excès d'acidité gastrique),
- les remontées ou renvois acides (pyrosis),
- les aigreurs d'estomac

2. **QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?**

Contre-indications

Ne prenez jamais STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent :

Chez l'enfant (moins de 15 ans).

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament :

- en cas de phénylcétonurie
- si vous êtes allergique à l'un des composants (notamment à la cimétidine).

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé avec la phénytoïne.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent :

Mises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Ce médicament est réservé à l'adulte.

Précautions d'emploi

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN avant d'utiliser ce médicament si vous êtes une personne âgée, en cas d'insuffisance rénale (défaillance des fonctions du rein) ou en cas d'insuffisance hépatique (défaillance des fonctions du foie).

Le traitement ne devra pas excéder 5 jours, sans avis médical.

En cas de persistance des troubles, CONSULTER VOTRE MEDECIN afin d'en rechercher l'origine.

Si vous suivez un régime sans sel ou pauvre en sel, tenez compte de la quantité de sodium contenue dans chaque comprimé effervescent : 476 mg.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient de la **cimétidine**. D'autres médicaments en contiennent... Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'administration et posologie).

La cimétidine peut augmenter l'effet de certains médicaments métabolisés par le foie.

Toutefois, à la posologie maximale de 2 comprimés soit 400 mg/j par jour et en traitement de 5 jours, le risque d'interactions médicamenteuses est faible.

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de la cimétidine. Il convient d'espacer les prises de 2 heures entre les deux médicaments.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et notamment avec la phénytoïne, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

EN CAS DE DOUTE PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament alors que vous êtes enceinte.

Prévenez le médecin chargé de surveiller votre grossesse ; il vous conseillera un traitement plus adapté à votre état.



Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, il convient de ne plus l'utiliser si vous désirez allaiter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable : benzoate de sodium, sodium (476 mg par comprimé), aspartam.

3. COMMENT PRENDRE STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant (moins de 15 ans)

Posologie

Réservé à l'adulte

Prendre 1 comprimé en fonction des symptômes

- soit au moment de la crise douloureuse,
 - soit avant le repas,
 - soit au moment du coucher,
- Sans dépasser 2 comprimés par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Avant de prendre ce médicament, faites dissoudre les comprimés effervescents dans un verre d'eau.

Espacez les prises,

Si les douleurs persistent plus d'une heure après la première prise, prenez un deuxième comprimé sans dépasser 2 comprimés par jour.

Durée de traitement

La durée maximum d'utilisation est limitée à 5 jours.

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 5 jours de traitement, n'augmentez pas la dose, mais consultez votre médecin.

Si vous avez pris plus de STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage accidentel, **ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN.**

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- diarrhée, douleurs musculaires, étourdissements, éruptions cutanées, fièvre,
- gonflement des seins, écoulement de lait,
- confusion spécialement chez le sujet âgé et en cas d'insuffisance rénale,
- ralentissement du rythme cardiaque (surtout lorsque le médicament est utilisé par voie injectable),
- inflammation du foie, du rein, du pancréas,
- réaction allergique,

CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

Les brûlures d'estomac, remontées et renvois acides, les aigreurs d'estomac peuvent être dus à des modifications de l'alimentation (mets acides-épicés, boissons alcoolisées) ou à la prise de médicaments (aspirine - anti-inflammatoires...).

N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant tout traitement.

Afin de prévenir ces symptômes respectez, autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- évitez les repas abondants et riches en graisse,
- variez votre alimentation,
- normalisez votre poids,
- faites de l'exercice,
- évitez le tabac et les excès d'alcool.

- élévation dans le sang du taux de certaines valeurs biologiques (transaminases, créatinine),
- diminution des globules blancs, des globules rouges et/ou des plaquettes sanguines.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent ?

La substance active est :

Cimétidine base 200 mg

Pour un comprimé effervescent.

Les autres composants sont :

Benzoate de sodium, macrogol 6000, aspartam, saccharine sodique, arôme orange, arôme mandarine, couple effervescent (bicarbonate de sodium et citrate monosodique).

Qu'est-ce que STOMEDINE 200 mg, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 2, 4, 6 ou 10.

Titulaire

Laboratoires GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, route de Versailles

BP 23

78164 Marly-Le-Roi Cedex

Exploitant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, route de Versailles

B.P. 23

78164 MARLY LE ROI CEDEX

Fabricant

FAMAR FRANCE

1, avenue du Champs de Mars

45072 ORLEANS CEDEX 2

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Janvier 2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).