



DACRYOSERUM®

SOLUTION POUR LAVAGE OPHTALMIQUE

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Borax : _____ 1,20 g

Acide borique : _____ 1,80 g

Bromure de benzododécinium, chlorure de sodium, concentré d'eau de rose, eau purifiée. Pour 100 ml de solution pour lavage ophtalmique.

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour lavage ophtalmique, flacon de 150 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antiseptique local / astringent léger à usage ophtalmique (S : organe des sens).

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE

McNeil S.A.S.

ISSY-LES-MOULINEAUX

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

McNeil Santé Grand Public

1, rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

PHARMASTER - Z.I. de Krafft - 67150 ERSTEIN

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT?

Lavage oculaire en cas d'irritation conjonctivale.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ, dans les cas suivants :

Allergie connue à l'un des constituants de la solution. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Il est recommandé d'éviter l'utilisation de ce produit en cas de port de lentilles de contact souples hydrophiles en raison de la présence d'un conservateur (bromure de benzododécinium) susceptible de s'adsorber sur ce type de lentilles.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de traitement concomitant par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation simultanée d'une autre solution oculaire.

Dans ce cas, il convient d'attendre 15 minutes avant de pratiquer l'instillation du collyre.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT?

POSOLOGIE

1 à 3 lavages oculaires par jour. Les lavages se font de façon directe par jet en retournant le flacon et en appuyant légèrement sur celui-ci, en prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon avec la surface de l'œil et en essuyant l'excédent avec une compresse ou du coton hydrophile.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie locale.

EN LAVAGE OCULAIRE

Se laver soigneusement les mains.

Éviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

Reboucher le flacon après utilisation.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ.

En cas de traitement concomitant par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver plus de 28 jours après ouverture.

Notez la date d'ouverture en clair sur l'emballage.

Les autres conditions d'utilisation et de conservation sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Mars 2008.

McNeil Santé Grand Public
1, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX



EOFF60105 © McNeil 2008



McNeil Santé Grand Public participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et l'élimination des déchets issus de médicaments. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.