

GASTROPAX,

poudre pour solution buvable

Carbonate de calcium, Trisilicate de magnésium, Carbonate de magnésium léger, Kaolin lourd, Bicarbonate de sodium, Hydroxyde de magnésium, Phosphate tricalcique.

1 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les douleurs et les brûlures de l'œsophage ou dans les douleurs, les brûlures et les aigreurs de l'estomac.

2 - ATTENTION ! DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de :

- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
 - maladie rénale grave,
 - hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec des quinidiniques.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales

Si les troubles ne disparaissent pas en une dizaine de jours, si les douleurs sont associées à une fièvre, à des vomissements, il convient de consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

Éviter le tabac, les boissons alcoolisées, les repas trop épicés, le stress, certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires) pouvant entraîner des brûlures ou aigreurs d'estomac.

En cas de maladie rénale ou de dialyse chronique, consulter votre médecin.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (164 mg par cuillère à café).

En cas de doute ne pas hésiter à

demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment avec les quinidiniques, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments.

Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre l'antiacide et un autre médicament.

Grossesse-allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Ce médicament peut être administré pendant l'allaitement si besoin. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

3 - COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

Diluer dans un verre d'eau, 1 cuillère à café au moment des douleurs (pas plus de 6 prises par jour).

Il est habituellement inutile de dépasser cette posologie.

Si celle-ci ne suffit pas à vous calmer, consultez votre médecin.

Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise :

- il peut ne pas être adapté à un autre cas.

- ne pas le conseiller à une autre personne.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :
- troubles du transit (constipation/diarrhée),
- à fortes doses et prolongées, risque de diminution de la quantité de phosphore dans l'organisme, survenue possible de calculs et de troubles rénaux graves.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5 - CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Date de révision de la notice
Décembre 1997.

6 - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Les substances actives sont :

Carbonate de calcium	20 g,
Trisilicate de magnésium	20 g,
Carbonate de magnésium léger	20 g,
Kaolin lourd	15 g,
Bicarbonate de sodium	15 g,
Hydroxyde de magnésium	6 g,
Phosphate tricalcique	3 g.

Excipient : teinture de badiane.

Pour 100 g de poudre pour solution buvable.

1 cuillère à café contient 4 g de poudre soit 360 mg de calcium, 392 mg de magnésium et 164 mg de sodium.

Forme pharmaceutique

Poudre pour solution buvable, boîte de 100 g.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIACIDE (A : Appareil digestif et métabolisme).



Les laboratoires Lehnig participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



LEHNIG
LABORATOIRES

622 101-04

Laboratoires Lehnig - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

GASTROPAX,

powder for oral solution

Calcium carbonate, Magnesium trisilicate, Light magnesium carbonate, Heavy kaolin, Sodium bicarbonate, Magnesium hydroxide, Tricalcic phosphate.

1 - WHEN TO USE THIS MEDICINE

This medicine is recommended in the pains and heartburn of oesophagus or in the pains, and heartburn of stomach.

2 - WARNING! WHEN NOT TO USE THIS MEDICINE

This medicine must not be taken in case of :

- known hypersensitivity to any of its constituents,
- severe renal disease,
- hypercalcaemia (abnormally high level of calcium in the blood).

In general, this medicine must not be used in association with quinidinics.

If in doubt, you must ask the advice of your doctor or pharmacist.

Special warnings

If the disorders persist after 10 days of treatment, if the pains are associated with fever, vomiting, it is appropriate to consult your doctor.

Precautions

Avoid tobacco, alcoholic drinks, too spiced meals, stress or certain medicines (aspirin, anti-inflammatory medicines) which may lead to burns or heartburn of the stomach.

In case of renal disease or chronic dialysis, consult your doctor.

In case of salt-free or low-salt diet, the sodium content must be taken into account (164 mg per teaspoon).

In doubt, do not hesitate to ask the advice of your doctor or pharmacist.

Medicine interactions and other interactions

In order to prevent possible interactions between several medicines, in particular with quinidinics, you must systematically inform your doctor or pharmacist of any other undergoing treatment.

Antiacids can decrease the effect of many other medicines. By precaution, it is advisable to respect an interval of 2 hours between intake of an antiacid and another medicine.

Pregnancy - breast-feeding

In general, the use of this medicine during pregnancy should be avoided.

If you discover you are pregnant during the treatment, you should consult your doctor who will decide if you can take this medicine.

This medicine can be taken during breast-feeding if necessary.

As a matter of general principle, you should always ask the advice of your doctor or pharmacist before taking any medicine if you are pregnant or breast-feeding.

3 - HOW TO USE THIS MEDICINE

Dosage

Mix 1 teaspoon with a glass of water when appearance of pains (do not take more than 6 intakes a day).

It is usually useless to exceed this dosage. If it is not enough to ease your pain, consult your doctor.

This medicine was personally given to you in a precise situation :

- It can be not adapted to another case.

- Do not recommend it to another person.

Method and route of administration

Oral use.

4 - UNDESIRABLE AND TROUBLESOME EFFECTS

In common with all active substances, this medicine may cause troublesome effects of varying degrees in certain individuals :

- transit disorders (constipation/diarrhoea),
- in case of high doses and long-term use,

risk of decrease of the quantity of phosphorus in the organism, renal calculus and serious renal disorders can occur.

Tell your doctor or pharmacist about any other undesirable and troublesome effect not mentioned in this packaging leaflet.

5 - STORAGE

Do not use after the expiry date shown on the outer packaging.

Date of review of packaging leaflet.

December 1997.

6 - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

The active substances are :

Calcium carbonate	20 g,
Magnesium trisilicate	20 g,
Light magnesium carbonate	20 g,
Heavy kaolin	15 g,
Sodium bicarbonate	15 g,
Magnesium hydroxide	6 g,
Tricalcic phosphate	3 g.

Excipient : tincture of star anise.

For 100 g of powder for oral solution.

One teaspoon contains 4 g of powder i.e.

360 mg of calcium, 392 mg of magnesium and 164 mg of sodium.

Pharmaceutical form

Powder for oral solution, box of 100 g.

Pharmacotherapeutic group

ANTIACID (A : Digestive system and metabolism).



LEHNIG
LABORATOIRES

Laboratoires Lehnig - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France