

L8,

solution buvable en gouttes

Benzoicum acidum 2 DH, Apocynum cannabinum 8 DH, Ononis spinosa 2 DH, Colchicum 4 DH, Solidago TM, Berberis TM, Coccus cacti 3 DH, Hexaminum 3 DH, Herniaria glabra 3 DH, Belladonna 3 DH,

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

- Attention : si les troubles persistent, consultez un médecin.

1 - QU'EST-CE QUE L8, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

L8, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé dans les cystalgies et dans les oliguries. Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en gouttes en flacon de 30 ml (environ 1 200 gouttes).

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER L8, solution buvable en gouttes ?

Précautions particulières :

Ce produit contient au maximum 45% (V/V) d'éthanol. 20 gouttes contiennent 178 mg d'éthanol, équivalent à 4,49 ml de bière (env. 0,45 cl) ou 1,87 ml de vin (env. 0,19 cl). En raison de la présence d'éthanol, ce médicament est dangereux pour les personnes souffrant d'alcoolisme. La présence d'éthanol doit également être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les personnes à risque, par exemple chez les personnes souffrant d'une maladie du foie ou d'épilepsie.

Aliments et boissons :

Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

Éthanol.

Utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3 - COMMENT UTILISER L8, solution buvable en gouttes ?

En l'absence de prescription particulière de votre médecin, la posologie est de :

Adultes : Traitement de fond : 20 gouttes, 3 fois par jour. Voie orale.

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Cystalgies aiguës : 1 à 2 prises supplémentaires par jour, au moment des crises.

Enfants : selon avis médical.



TENIR LE FLACON
VERTICALEMENT

Si vous avez pris plus de L8, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû : Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre L8, solution buvable en gouttes :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, L8, solution buvable en gouttes est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER L8, solution buvable en gouttes ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Les substances actives sont :

Benzoicum acidum	2 DH,
Apocynum cannabinum	8 DH,
Ononis spinosa	2 DH,
Colchicum	4 DH,
Solidago	TM,
Berberis	TM,
Coccus cacti	3 DH,
Hexaminum	3 DH,
Herniaria glabra	3 DH,
Belladonna	3 DH,
p.e.q.s.p. 30 ml.	

Les autres composants sont :

Éthanol, eau purifiée.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / Fabricant :

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France.



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622 035-03

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France

L8,

oral drops, solution

Benzoicum acidum 2 DH, Apocynum cannabinum 8 DH, Ononis spinosa 2 DH, Colchicum 4 DH, Solidago TM, Berberis TM, Coccus cacti 3 DH, Hexaminum 3 DH, Herniaria glabra 3 DH, Belladonna 3 DH.

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.

It contains important information for your treatment.

If you have further questions or doubts, please ask your doctor or your pharmacist.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.

- Ask your pharmacist if you need more information or advice.

- Warning : you must see a doctor if your symptoms do not improve.

1 - WHAT L8, oral drops solution IS AND WHAT IT IS USED FOR ?

L8, oral drops solution is a homeopathic medicine traditionally used in cystalgia and oliguria.

This medicine is marketed as oral drops solution in a 30 ml bottle (about 1 200 drops).

2 - BEFORE YOU USE L8, oral drops solution

Special precautions :

This product contains a maximum of 45 (V/V) % of ethanol. 20 drops contain 178 mg of ethanol, equivalent to 4,49 ml beer (about 0,45 cl) or 1,87 ml wine (about 0,19 cl). Harmful for those suffering from alcoholism.

To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease or epilepsy.

Using L8, oral drops solution with food and drink :

Preferably not take with meals.

Pregnancy and breast-feeding :

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

List of excipients with a recognised effect :

Ethanol.

Using other medicines :

Please inform your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, even those not prescribed.

3 - HOW TO USE L8, oral drops solution ?

In the absence of specific instructions from your doctor, the dosage is :

Adults: 20 drops, 3 times a day.

Acute cystalgia : 1 to 2 supplementary doses per day, during attacks.

Children : according to medical advice.

Take in a small amount of water,

preferably not take with meals.

Oral use.



HOLD THE BOTTLE
VERTICALLY

If you take more L8, oral drops solution than you should :

Consult your doctor or pharmacist.

If you forget to take L8, oral drops solution :

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

4 - POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, L8, oral drops solution can have side effects.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

5 - STORING L8, oral drops solution

Keep out of the reach and sight of children.

Keep the container tightly closed.

Do not use after the expiry date stated on the carton.

Store below 25°C.

The active substances are :

Benzoicum acidum	2 DH,
Apocynum cannabinum	8 DH,
Ononis spinosa	2 DH,
Colchicum	4 DH,
Solidago	TM,
Berberis	TM,
Coccus cacti	3 DH,
Hexaminum	3 DH,
Herniaria glabra	3 DH,
Belladonna	3 DH,
p.e.q.s.p. 30 ml.	

The other ingredients are :

Ethanol, purified water.

Marketing authorisation holder / Manufacturer

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France.



LEHNING
LABORATOIRES

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France