

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

VASCULOPROTECTEUR

(C : système cardio-vasculaire)

(S : organes sensoriels)

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué :

- dans les troubles de la circulation veineuse,
- dans la fragilité des petits vaisseaux sanguins,
- dans les troubles visuels d'origine circulatoire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre indications :

Ne prenez jamais DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants du comprimé enrobé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

3. COMMENT PRENDRE DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?

Posologie :

3 à 6 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler, sans les croquer, avec un verre d'eau.

Durée du traitement :

Le traitement doit être pris par cure de 20 jours par mois et renouvelé si nécessaire. Se conformer à l'avis de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé que vous n'auriez dû : Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. Cependant, une utilisation excessive pourra entraîner une aggravation des effets indésirables.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : **rare troubles digestifs.**

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DIFRAREL[®] 100 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Précautions d'emploi :

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorise la circulation sanguine.

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux augmentent (les bleus et les ecchymoses s'étendent), consultez immédiatement votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient à effet notoire : saccharose.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DIFRAREL® 100 mg, comprimé enrobé ?

Les substances actives sont :

Extrait anthocyanosidique de Vaccinium myrtillus 100 mg
Bêta-carotène 5 mg
Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont :

Kieselguhr (diatomite pour œnologie), sucre glace amylicé, talc, amidon de maïs, stéarate de magnésium, colophane, huile essentielle de térébenthine type « Pinus pinaster », gomme laque, saccharose, gélatine, gomme arabique, dioxyde de titane, bleu patenté V, Opaglos 6000.

QU'EST-CE QUE DIFRAREL® 100 mg, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé. Boîte de 20 ou 60 comprimés enrobés.

Titulaire / Exploitant :

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

86-88, rue Ampère
Z.I. des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Fabricant :

CENEXI

68-84, rue Ampère
Z.I. des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : octobre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afsaps (France).

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

LEURQUIN MEDIOLANUM cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
LEURQUIN MEDIOLANUM participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.
LEURQUIN MEDIOLANUM vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

