

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

PRIODERM, lotion Malathion

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PRIODERM, lotion et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PRIODERM, lotion ?
3. Comment utiliser PRIODERM, lotion ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PRIODERM, lotion ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PRIODERM, lotion ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce produit est une lotion antiparasitaire contenant du malathion, indiquée dans le traitement des poux et des lentes du cuir chevelu (poux de tête).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PRIODERM, lotion ?

N'utilisez jamais PRIODERM, lotion :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au malathion ou à l'un des autres composants contenus dans PRIODERM, lotion.

Faites attention avec PRIODERM, lotion :

Mises en garde spéciales

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

- Avant de traiter un enfant de moins de 2 ans, consultez votre médecin. En effet, le mode d'administration de ce produit doit être adapté.
- En cas d'antécédent de convulsion, demandez conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit.

Attention :

Liquide inflammable : les applications doivent être effectuées dans un endroit bien aéré. **Ne pas sécher les cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux (risque d'inflammation)** et tenir éloigné de toute source de chaleur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

- Le produit doit être utilisé avec précaution chez les enfants ayant des antécédents de convulsions (avec ou sans fièvre). En effet, cette spécialité contient des **terpènes** qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Il est important de respecter les conseils d'utilisation (voir COMMENT UTILISER PRIODERM, lotion).
- En raison du caractère irritant du produit pour la peau et les muqueuses, en cas de contact accidentel sur le nez, la bouche ou les yeux, au niveau du cou, derrière les oreilles, des épaules, du visage, rincez abondamment à l'eau.
- Protégez les yeux et le visage lors de l'application.
- N'appliquez pas en direction des yeux, du nez, de la bouche.

- N'avez pas le produit.
- Ne respirez pas la lotion appliquée : utilisez ce produit dans un **endroit aéré**.
- N'appliquez pas la lotion près d'une flamme ou d'un objet incandescent (source de chaleur). Ne fumez pas.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux (risque d'inflammation).
- Laissez sécher à l'air libre : ne couvrez pas les cheveux après application du produit, par exemple avec un bonnet en caoutchouc.

Pour éviter toute recontamination :

- lavez à 60° les vêtements, bonnets, écharpes, draps, taies d'oreiller, peignes, brosses, etc.
- traitez les personnes en contact avec la personne traitée en cas de signe d'infestation.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER PRIODERM, lotion ?

Posologie

- L'application de la lotion se fait sur le cuir chevelu et les cheveux secs dans un endroit aéré et éloigné de toute flamme ou objet incandescent. Ne fumez pas.
- Veillez à protéger les yeux, le nez et la bouche avec une serviette.
- Pour ouvrir le flacon, appuyez sur le bouchon de sécurité et dévissez simultanément (sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Appliquez la lotion pure progressivement

sur cheveux secs :
10 à 20 ml selon l'épaisseur et la longueur de la chevelure.

- Imprimez correctement les cheveux et le cuir chevelu.

Une augmentation des quantités appliquées n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit.

- En cas de contact au niveau du cou, derrière les oreilles, des épaules, du visage, lavez et rincez la peau.
- En cas de projection accidentelle sur le nez, la bouche ou les yeux, rincez abondamment avec de l'eau.
- Laissez sécher les cheveux naturellement à l'air. **N'utilisez pas de sèche-cheveux (risque d'inflammation). Ne couvrez pas les cheveux après application du produit, par exemple avec un bonnet en caoutchouc.**
- Laissez agir environ 8 heures puis lavez les cheveux avec un shampoing doux facilitant le décrochage des lentes mortes.
- Peignez avec le peigne fin pour éliminer poux et lentes mortes.

Pour un enfant de moins de 2 ans, consultez votre médecin. En effet, le mode d'utilisation et le temps d'application doivent être adaptés. En particulier, le produit doit être appliqué sur le cuir chevelu à l'aide d'un tampon imbibé.

Mode d'administration

USAGE EXTERNE en application sur le cuir chevelu.

NE PAS AVALER - NE PAS INHALER

Durée de traitement

- Appliquez la lotion et laissez environ 8 heures avant rinçage avec un shampoing doux.
- Chez l'enfant de moins de 2 ans et en cas de grossesse, la durée d'application sera diminuée. Consultez votre médecin.
- Si nécessaire, l'application peut être renouvelée 7 jours après.

Si vous avez utilisé plus de PRIODERM, lotion que vous n'auriez dû :

En cas d'application trop importante sur le cuir chevelu, lavez les cheveux avec un shampoing doux.

Dans le cas où un excès de produit coulerait sur le cou ou les épaules, lavez et rincez abondamment.

En cas d'ingestion accidentelle, avertissez immédiatement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PRIODERM, lotion est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le produit est susceptible d'entraîner une irritation cutanée.

Dans certains cas, les effets indésirables suivants peuvent être observés : rougeur, démangeaisons, rares sensations de brûlure du cuir chevelu et parfois apparition de pellicules.

De rares cas de nausées, vomissements et maux de tête ont été observés.

Exceptionnellement des cas de brûlures au niveau du front et derrière l'oreille ont été rapportés après recouvrement des cheveux par exemple avec un bonnet de caoutchouc ou en cas de persistance de liquide dans le sillon derrière l'oreille.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PRIODERM, lotion ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PRIODERM, lotion après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PRIODERM, lotion ?

La substance active est :

Malathion 0,50 g
Pour 100 ml.

Les autres composants sont :

Terpinéol, parfum (pin de Sibérie), alcool isopropylique.

Qu'est ce que PRIODERM, lotion et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de lotion. Flacon de 110 ml.

Titulaire

MEDA PHARMA

25, bd de l'Amiral Bruix
75016 Paris – France

Sous licence Mundipharma AG Bâle/Suisse

Exploitant

MEDA PHARMA

25, bd de l'Amiral Bruix
75016 Paris – France
Tel. : 01 56 64 10 70

Fabricant

MEDA MANUFACTURING

AVENUE J.F. KENNEDY
33700 MERIGNAC - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 avril 2009

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).