

3 - COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Posologie

Réservé à l'adulte

Voie orale

3 gélules par jour

Avaler les gélules telles quelles avec un verre d'eau.

Mode et voie d'administration

Voie orale

Fréquence d'administration

Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir avec un verre d'eau, de préférence en dehors des repas.

Si vous avez pris plus de CARBOLEVURE ADULTES, gélule que vous n'auriez dû :

La prise de doses élevées de Carbolevure peut entraîner une légère constipation. Le traitement sera symptomatique. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARBOLEVURE ADULTES, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CARBOLEVURE ADULTES, gélule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés à tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

Les substances actives sont :

Levure déshydratée vivante contenant au minimum 10⁸ cellules de Saccharomyces cerevisiae par gramme108,5 mg
Charbon activé109,0 mg
Pour une gélule

Les autres composants sont :

Polyvidone K30, silice colloïdale.

Composition de l'enveloppe de la gélule

• tête : oxyde de fer noir, dioxyde de titane, gélatine.
• corps : érythrosine, oxyde de fer rouge, dioxyde de titane, gélatine.

Qu'est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 20 ou 30 gélules.

Titulaire :

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne - France

Exploitant :

PIERRE FABRE MEDICAMENT

29, Avenue du Sidobre - 81106 CASTRES Cedex

Fabricant :

NEXTPHARMA S.A.S - 17, Route de Meulan - 78520 Limay

ou

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Etablissement Progipharm - Rue du Lycée - 45500 Gien - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : mai 2011

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'AFSSAPS (France).

Information médicale tél : 0800 95 05 64

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - QU'EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
- 3 - COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
- 4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5 - COMMENT CONSERVER CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
- 6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1 - QU'EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ADSORBANT INTESTINAL / FLORE DE SUBSTITUTION (A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué chez l'adulte :

- en cas de digestion difficile, notamment avec ballonnement intestinal
- en complément de la réhydratation et/ou des mesures diététiques, dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?

N'utilisez jamais CARBOLEVURE ADULTES, gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des constituants

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec CARBOLEVURE ADULTES, gélule :

Mises en garde spéciales

En cas de diarrhée, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, fèves, pois...) ainsi que certains légumes verts (choux, chou de Bruxelles, bettes...).
- En cas de diarrhée, il est nécessaire de :
 - se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)
 - s'alimenter le temps de la diarrhée,
 - en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés ainsi que les aliments ou boissons glacés.
 - en privilégiant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A CONSULTER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui (plus de 2 heures, si possible).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.


Pierre Fabre

723 707 - TO



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.