



### COMPRIMÉ ENROBÉ

#### • IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

##### COMPOSITION

ARTICHAUT (extrait aqueux sec de feuilles) \_\_\_\_\_ 200 mg

Excipients : Trisilicate de magnésium, amidon de maïs prégélatinisé, talc, stéarate de magnésium, gomme laque, colophane, gélatine, saccharose, carbonate de calcium, dispersion colorante, cire de carnauba, polysorbate 80, pour un comprimé enrobé de 350 mg.

Un comprimé contient 0,08 g de saccharose.

#### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé.

Boîte de 60 ou de 180 comprimés sous plaquettes thermoformées.

#### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

MÉDICAMENT DE PHYTOTHÉRAPIE à visée CHOLAGOGUE-CHOLÉRÉTIQUE

(A : Appareil digestif et métabolisme)

#### NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

##### DE MISE SUR LE MARCHÉ :

Titulaire/Siège social : Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA

68, rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS - France

Exploitant/Fabricant : Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA

2, av. du Traité de Rome - BP 51 - 78401 CHATOU CEDEX - France

#### • DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.

#### • ATTENTION !

##### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Vous NE DEVEZ PAS prendre ce médicament en cas de :

- allergie connue à l'un des constituants, notamment parahydroxybenzoate de méthyle ou parahydroxybenzoate de propyle.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

UTILISER CE MÉDICAMENT AVEC PRÉCAUTION en cas d'obstruction des voies biliaires ou de graves maladies du foie. Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/ isomalate. En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

#### GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FACON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN, AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

#### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) - Parahydroxybenzoate de propyle (E 216) contenus dans la dispersion colorante - Saccharose.

#### • COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT RÉSERVÉ À L'ADULTE

##### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Avaler avec un peu d'eau, 1 à 2 comprimés avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

#### • EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- à forte dose : risque de diarrhée.

- en raison de la présence de parabènes (parahydroxybenzoates), ce médicament peut provoquer de l'urticaire.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

#### • CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

#### • DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

août 2009.



Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA  
68, rue Jean-Jacques Rousseau  
75001 PARIS  
Tél. : +33 (0) 1 34 80 72 60

7089600