

Arnigel®

GEL

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement, consultez un médecin.

ARNIGEL®, gel

La substance active est pour 100 g :

Arnica montana teinture mère 7 g

Les autres composants sont :

Carbomère, Hydroxyde de sodium,
Ethanol, Eau purifiée.

Titulaire, exploitant et fabricant :

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy

1- QU'EST-CE QUE ARNIGEL®, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ARNIGEL®, gel est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement local d'appoint en traumatologie bénigne en l'absence de plaie (ecchymoses, contusions, fatigue musculaire...), chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an.

2- INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER ARNIGEL®, gel:

En cas d'hypersensibilité à l'Arnica ou à l'un des excipients : ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion infectée ou une plaie.

Grossesse et Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient à effet notoire :

Ethanol.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3- COMMENT PRENDRE ARNIGEL[®], gel ?

Voie cutanée.

Appliquer dès que possible une fine couche d'**ARNIGEL[®], gel** sur la région douloureuse en massage léger jusqu'à pénétration complète. Renouveler l'application une à deux fois par jour.

*Si vous avez l'impression que l'effet d'**ARNIGEL[®], gel** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

Si vous avez pris plus d'ARNIGEL[®], gel que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ARNIGEL[®], gel :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ARNIGEL[®], gel est susceptible d'avoir des effets indésirables :

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'Arnica.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau

peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ARNIGEL[®], gel ?

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Conserver le tube soigneusement fermé.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2013

