



# GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule

## Cuivre

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

*Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.*

- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- *Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- *Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.*
- *Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. Qu'est-ce que GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé ?**

OLIGOTHERAPIE (V : divers).

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états infectieux et viraux, d'états grippaux, au cours d'affections rhumatismales inflammatoires et au cours de l'arthrose.

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?**

### **Ne prenez jamais GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :**

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Faites attention avec GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule :**

#### **Mises en garde spéciales :**

- Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne respiratoire.

- Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

#### **Précautions d'emploi :**

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement :**

- Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

- *D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.*





**Informations importantes concernant certains composants de ce médicament :**

Excipients à effet notoire : Hydrosulfite de sodium, sulfite de sodium.

**3. Comment prendre GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?**

**Posologie :**

RESERVE A L'ADULTE

2 à 3 ampoules par jour.

Traitement de l'arthrose : 1 ampoule 3 fois par jour.

**Mode et voie d'administration :**

Voie orale.

Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau.

**Fréquence et administration :**

A prendre de préférence en dehors des repas.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. Comment conserver GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**Date de péremption :**

Ne pas utiliser GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

**Conditions de conservation :**

A conserver à une température inférieure à 25°C. *Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.*

**6. Informations supplémentaires.**

**Que contient GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?**

**La substance active est :**

Cuivre ..... 0,3 mg  
Pour une ampoule de 2 ml.

**Les autres composants sont :**

Amylose, glycérol, phosphate disodique dihydraté, dihydrogénophosphate de potassium anhydre, hydrosulfite de sodium, sulfite de sodium, eau purifiée.

**Qu'est-ce que GRANIONS DE CUIVRE 0,3 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable.

Boîte de 30 ampoules de 2 ml.

**Titulaire / Exploitant**

**LABORATOIRE DES GRANIONS**

7, RUE DE L'INDUSTRIE

LE MERCATOR

98000 MONACO

Tel. 00 377 92 05 76 30

Fax 00 377 92 05 32 70

**Fabricant**

**LABORATOIRE DES GRANIONS**

7, RUE DE L'INDUSTRIE

LE MERCATOR

98000 MONACO

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 02 juin 2006.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

