



GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule

Gluconate de zinc

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- *Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- *Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.*
- *Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé ?

OLIGOTHERAPIE (V : divers)

Ce médicament à base de zinc est préconisé dans l'acné.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?

Ne prenez jamais GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant :

- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule :

Précautions d'emploi :

Pour une meilleure absorption du produit :

- le médicament sera pris à jeun
- pendant la durée du traitement, on s'abstiendra de consommer certains aliments au repas suivant la prise du médicament (pain complet, germes de soja, grains de maïs ...)
- afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- en particulier, n'omettez pas de signaler un traitement par antibiotiques, médicaments contenant du calcium ou du fer (qui diminueraient l'absorption du produit).

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

- SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

- Ce médicament ne doit être utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
- Si vous envisagez une grossesse ou si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez





votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement, tout en l'adaptant à votre état.

- Ce médicament peut être utilisé pendant l'allaitement.
- *D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.*

3. Comment utiliser GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?

Posologie :

- ampoules destinées à la voie orale.
- la dose journalière usuelle est de 2 ampoules prises le matin à jeun avec un verre d'eau.
- Cette posologie pourra être diminuée selon l'avis du médecin traitant après les trois premiers mois de traitement.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Au cours du traitement, il est possible que surviennent des douleurs de l'estomac et du ventre ; elles sont habituellement modérées et transitoires.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, Solution buvable en ampoule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption :

Ne pas utiliser GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation :

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut

faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires.

Que contient GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule ?

La substance active est :

Gluconate de zinc

Quantité correspondante en zinc 15,00 mg

Pour une ampoule de 2 ml.

Les autres composants sont :

Amylose, glycérol, glycine, eau purifiée.

Qu'est-ce que GRANIONS DE ZINC 15 mg / 2 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable.

Boîte de 30 ampoules de 2 ml.

Titulaire / Exploitant

LABORATOIRE DES GRANIONS

7, RUE DE L'INDUSTRIE

LE MERCATOR

98000 MONACO

Tel. 00 377 92 05 76 30

Fax 00 377 92 05 32 70

Fabricant

LABORATOIRE DES GRANIONS

7, RUE DE L'INDUSTRIE

LE MERCATOR

98000 MONACO

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 15 novembre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

