

Econazole EG® L.P. 150 mg

Ovule à libération prolongée

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

La substance active est :

Nitrate d'éconazole..... 150 mg

Pour un ovule à libération prolongée.

Les autres composants sont :

Galactomannane, silice colloïdale anhydre, glycérides hémisynthétiques solides, énantate de stéaryle.

Titulaire / Exploitant

EG LABO - Laboratoires EuroGenerics
"Le Quintet" - Bât. A - 12, rue Danjou
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

Fabricant

UNITHER INDUSTRIES
Z.I. le Malcourlet
03800 GANNAT

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'ovule à libération prolongée. Boîte de 1 ovule.

Ce médicament contient du nitrate d'éconazole : un antifongique et antibactérien.

Il est utilisé dans le traitement local des mycoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la vulve et du vagin parfois surinfectées.

050677A

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

Ne pas utiliser ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée dans les cas suivants :

- allergie à l'un des composants du produit (voir composition) ou à une substance apparentée (appartenant au groupe des imidazolés),
- utilisation avec un diaphragme en latex.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée :

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale, l'acidité favorisant la prolifération des champignons (voir les conseils pratiques de la rubrique "Comment utiliser ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?")

Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au-delà de 24 à 48 heures, interrompez le traitement et consultez votre médecin.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) ni avec un diaphragme en latex (risque de rupture du diaphragme).

3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

050677A

Dans la majorité des cas, 1 ovule de préférence le soir au coucher, en administration unique.

Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire un ovule le soir et un ovule le lendemain matin.

Dans tous les cas, se conformer strictement aux recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez l'impression que l'effet de ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie vaginale.

Introduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux pliés et écartés.

CONSEILS PRATIQUES

- ✓ toilette avec un savon pH neutre ou alcalin,
- ✓ afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette),
- ✓ votre médecin pourra :
 - traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine,
 - vous prescrire un antifongique à appliquer localement,
- ✓ portez des sous-vêtements en coton,
- ✓ évitez les douches vaginales,
- ✓ ne pas interrompre le traitement pendant les règles,
- ✓ évitez de porter des tampons internes pendant le traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- réactions au site d'application tels que sensations de brûlures, irritations, démangeaisons et érythème (*rougeur de la peau*),
- dermatites de contact (*inflammation de la peau*) et urticaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte et la plaquette.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Novembre 2004.